

PARVOVIRUSO INFEKCIJA (INFEKCIŅĒ ERITEMA)



KLAIPĖDOS MIESTO
VISUOMENĖS
SVEIKATOS BIURAS

Parvovirusas vaikams gali sukelti infekcinę eritemą, suaugusiems – sąnarių problemas. Būdingi sezoniniai ligos protrūkiai kovo – gegužės mėnesiais, bet galimi pavieniai atvejai bet kuriuo metų laiku.

- Inkubacinis periodas apie 5-15 d.
- Dažniausiai serga vaikai nuo 5 iki 15 m.
- Asmuo gali užkrėsti kitus likus 5-10 dienų iki atsirandant bėrimui, o šiam atsiradus, kitų žmonių užkrėsti jau nebegali.
- Persirgus įgijamas ilgalaikis imunitetas.

Pagrindinis šios ligos požymis – bėrimai skruostų srityje, kurie vėliau gali pristi ir liemens bei galūnių srityse. Suaugusiems – sąnarių skausmai, tinimas. Bėrimai praeina per 1-3 savaites, tačiau gali atsinaujinti pabuvus saulėje, pasportavus, nuo karščio ar streso.

Kiti požymiai: sloga, gerklės, galvos, sąnarių, raumenų skausmas, kosulys.

Plitimas ir simptomai:

- Plinta oro lašelių, buitinio kontakto būdais, per kraują ir placentą.
- Vaikams pasireiškianti odos bėrimu, suaugusiems – sąnariu skausmu ir kt., pavojinga nėščioms moterims.

Profilaktika

Vakcinės nėra.

Svarbu laikytis rankų higienos taisyklių, reguliariai vėdinti patalpas bei valyti paviršius.

Nėščioms moterims ir imunosupresyviems asmenims rekomenduojama vengti kontakto su sergančiais asmenimis ir naudoti asmens apsaugos priemones.